

Pouxit



Solution pour application cutanée

100%
EFFICACE*

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant toute utilisation.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION (pour 100 g de solution) :

Dimeticone 4 g.

Cyclomethicone 5 q.s.p. pour 100 g de solution.

INDICATION :

POUXIT se présente sous forme d'une lotion limpide et incolore en **flacon de 250 ml**. Il est indiqué dans le traitement des poux du cuir chevelu (poux de la tête) et des lentes chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 mois.

POUXIT contient du Dimeticone (dérivé de la silicone) à 4% et du Cyclomethicone 5. Le Cyclomethicone 5 agit comme un solvant volatil. Dès l'application sur le cuir chevelu, il s'évapore et laisse ainsi le Dimeticone tuer les poux et les lentes par action physique en les recouvrant.

POUXIT ne contient pas de substance au mode d'action neurotoxique sur le pou, il agit par effet physique.

MODE D'EMPLOI :

Usage externe uniquement sur cheveux et cuir chevelu secs. Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Ne pas appliquer sur peau lésée.

Suivre scrupuleusement le mode d'emploi afin d'obtenir l'efficacité optimale.

- 1) Appliquer la lotion uniformément et en quantité suffisante sur le cuir chevelu et les cheveux secs de façon à les recouvrir entièrement.
- 2) Masser les cheveux afin d'obtenir une imprégnation complète de la chevelure.
- 3) Laisser sécher les cheveux naturellement à l'air (ne pas utiliser de sèche-cheveux).
- 4) Laisser agir le produit 1 heure.

En cas d'application le soir, il est possible de laisser agir **POUXIT** une nuit complète. Par mesure d'hygiène, vous pouvez appliquer une serviette sur l'oreiller.

- 5) Laver les cheveux avec un shampoing doux, puis rincer à l'eau.

Répéter impérativement le traitement après 7 jours.

Si un membre de la famille a des poux, vérifier les autres membres de la famille et traiter tous les sujets atteints en même temps.

MISES EN GARDE :

Attention : la chevelure doit être tenue à l'écart de toute flamme, de cigarette ou de toute source de chaleur intense pendant l'application de **POUXIT** et jusqu'au rinçage. Les cheveux imprégnés brûlent facilement si enflammés. Ne pas fumer.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit (voir composition). En cas d'irritation de la peau ou de tout autre signe d'hypersensibilité locale ou générale, arrêter le traitement, laver la peau avec de l'eau et du savon et demander un avis médical.
- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle dans l'œil, rincer abondamment à l'eau claire. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau. Demander un avis médical.
- Les enfants de moins de 6 mois doivent être traités **uniquement sous surveillance médicale**.
- Risque de glissade en cas de projection du produit sur une surface lisse.
- **TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

POUXIT peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

EFFETS INDESIRABLES :

L'application de **POUXIT** peut s'accompagner d'une légère irritation. Parfois, une desquamation du cuir chevelu ainsi que des démangeaisons et irritations autour des yeux peuvent apparaître. De façon exceptionnelle et réversible, une perte limitée de cheveux peut être observée. Ne pas continuer à utiliser **POUXIT** en cas d'irritation cutanée ou de tout autre signe d'allergie, laver la peau avec de l'eau et du savon et demander un avis médical.

Si vous remarquez un effet indésirable quelconque, arrêtez le traitement et veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION :

A conserver dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte et le flacon.

Flacon de 250 ml e

Fabriqué par : Thornton & Ross Ireland Ltd.,
4045 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Co.Dublin, Republic of Ireland.

Distribué par : Coopération Pharmaceutique Française,
Place Lucien Auvert, 77020 Melun Cedex, France

www.pouxit.fr

* 100% d'efficacité pédiculicide ex-vivo.

